FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

THÈSE

927

ANNÉE 1966

n° 5.891 K

POUR LE

DOCTORAT EN MÉDECINE

DIPLÔME D'ÉTAT

PAR

VIRGILI Bernard, Arnaud, Philippe, Sylvain

né le 29 Décembre 1939 à Clichy

Présentée et soutenue publiquement le 18 Novembre 1966

ÉTUDE CLINIQUE

de l'Effet Antalgique de l'Acide Méfénamique

Président : M. DELBARRE, Professeur

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

Année 1966 n° 5.891 K

T H E S E

pour le

D O C T O R A T E N M E D E C I N E

(Diplôme d'Etat)

PAR

VIRGILI Bernard, Arnaud, Philippe, Sylvain

né le : 29/12/1.939 à Clichy

Présentée et soutenue publiquement le 18.11.1966

E T U D E C L I N I Q U E de

l' Effet Antalgique de l'Acide Méfénamique

Président : M. DELBARRE, Professeur

ETUDE CLINIQUE DE L'EFFET ANTALGIQUE DE L'ACIDE MEFENAMIQUE

Le Laboratoire Parke Davis a fourni le médicament destiné à cette étude.

UNIV.
LEIDEN
BIBL.

PROFESSEURS HONORAIRES

MM. Alajouanine (T.), Aubin (A.), Bénard (H.), Binet (L.), Bulliard (H.), Cathala (J.), Chabrol (E.), Chailley-Bert (P.), Debré (R.), Fey (B.) Galliard (H.), Gaudart d'Allaines (F. de), Gennes (L. de), Halphen (E.), Hazard (R.), Heuyer (G.), Laroche(G.), Lavier (G.), Lelong (M.), Levy-Solal (E.), Lian (C.), Marchal (G.), Mathieu (P.) Monod (R.), Monod (R.), Moreau (R.), Moulonguet (P.), Pasteur-Valléry-Radot, Petit-Dutaillis (D.), Piédelièvre (R.), Quénu (J.), Renard (G.), Richet (C.), Senèque (J.) Strohl (A.), Tanon (L.), Verne (J.)

DOYEN..... Georges BROUET

1er ASSESSEUR..... Daniel BARGETON
2ème ASSESSEUR..... Jean GOSSET.

I - PROFESSEURS

1° CHAIRES DE SCIENCES FONDAMENTALES

a) Professeurs titulaires :	MM.
Anatomie.....	DELMAS A.
Anatomie et cytologie pathologiques.....	DELARUE J.
Anesthésiologie.....	BAUMANN J.
Bactériologie et virologie.....	TOURNIER P.
Biochimie Médicale.....	JAYLE M.F.
-	POLONOVSKI J.
Biologie appliquée à l'Education physique et aux sports.....	MALMEJAC J.
Biologie Médicale.....	FAUVERT R.
Biophysique médicale.....	BUGNARD L.
-	DOGNON A.
-	DJOURNO A.
Cancérologie médicale et sociale	DENOIX P.
Chimie pathologique.....	SCHAPIRA G.
Embryologie.....	TUCHMANN H.
Génétique fondamentale.....	LEJEUNE J.
Histoire de la médecine et de la chirurgie.....	COURY Ch.
Histologie.....	GIROUD A.
Hygiène et médecine préventive.....	BOYER J.
Médecine du travail.....	DESOILLE H.
Médecine légale.....	DEROBERT L.
Microbiologie (Bactériologie et virologie).....	FASQUELLE R.
Parasitologie.....	BRUMPT L.C.
Pathologie chirurgicale.....	LAURENCE G.
-	KUSS R.
-	VERNE J.M.

.../...

Pathologie exotique	N.....
Pathologie expérimentale et comparée	MERKLEN F.P.
Pathologie médicale	LAROCHE Cl.
-	BRICAIRE H.
-	PEQUIGNOT H.
Pathologie respiratoire	TURIAF J.
Pathologie et thérapeutique générales	N...
Pharmacologie	CHEYMOL J.
-	LEVY Melle J.
Physiologie	BARGETON D.
-	PARROT J.
Physique et pathologie obstétricales	LEPAGE F.
Radiologie médicale	DESGREZ H.
Technique chirurgicale et chirurgie expérimentale	CAUCHOIX J.
Thérapeutique	CONTE M.
Thérapeutique appliquée	LAMOTTE M.

Professeurs à titre personnel :

Anatomie	CABROL
Anatomie anthropologique	OLIVIER G.
Anatomie pathologique	NEZELOF Ch.
Bactériologie	BARBIER P.
Biochimie médicale	DESGREZ P. DREYFUS J. Cl.
Biologie médicale	BOURLIERE F.
Histologie	COUJARD R.
Parasitologie	LARIVIERE M.
Pathologie expérimentale	LOEPER J. RICHET G.
Physiologie	DEOURS P. SCHERRER J. KELLERSHOHN L.
Physique médicale	GOUGEROT L. ROUCAYROL TUBIANA M.
Radiologie médicale	FISCHGOLD H.

2° CHAIRES DE SCIENCES CLINIQUES

a) professeurs titulaires

Clinique carcinologique chirurgicale (Necker)	REDON H.
Clinique cardiologique (Broussais)	SOULIE P.
- - (Boucicaut)	LENEGRE J.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41544317_0053

Cliniques chirurgicales (Beaujon)	LORTAT JACOB
Cliniques chirurgicales (-)	BAUMANN
Cliniques chirurgicales (Cochin)	LEGER L.
Cliniques chirurgicales (Hotel-Dieu)	PATEL J.
Cliniques chirurgicales (Saint-Antoine)	GOSSET J.
Cliniques chirurgicales (Salpètrière)	SICARD A.
Cliniques chirurgicales (Tenon)	OLIVIER Cl.
Clinique chirurgicale orthopédique et traumatologique (Cochin)	MERLE D'AUBIGNE R.
- - - - - (Foch)	PADOVANI P.
Clinique de chirurgie infantile et orthopédique (Enfants-Malades)	FEVRE M.
Clinique de chirurgie cardio-vasculaire (Broussais)	DUBOST Ch.
Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire (Laennec)	MATHEY J.
Clinique dermatologique (Saint-Louis)	DUPERRAT F.
Clinique endocrinologique (Pitié)	DECOURT J.
Clinique de Génétique médicale (Enfants-Malades)	LAMY M.
Clinique gynécologique (broca)	HUGUIER J.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques (Saint-Louis)	DEGOS R.
Clinique des maladies des enfants (Enfants-Malades)	TURPIN R.
Clinique des maladies infectieuses (Claude-Bernard)	MOLLARET P.
Clinique des maladies mentales et de l'encéphale (Saint-Anne)	DELAY J.
Clinique des maladies métaboliques (Necker)	HAMBURGER J.
Clinique des maladies du sang (Broussais)	BERNARD J.
Clinique des maladies du système nerveux (Salpêtrière)	CASTAIGNE P.
cliniques médicales (Bicêtre)	DEPARIS M.
cliniques médicales (Broussais)	MILLIEZ P.
cliniques médicales (Cochin)	BROUET G.
cliniques médicales (Hotel-Dieu)	BARIETY M.
cliniques médicales (Lariboisière)	SEZE S. de
cliniques médicales (Pitié)	DREYFUS G.
cliniques médicales (Saint-Antoine)	KOURILSKY R.
cliniques médicales (Saint-Antoine)	BOUDIN G.
Clinique d'hydrologie et de climatologie (Bichat)	DEBRAY CH.
Clinique médicale infantile et pédiatrie sociale (Enfants-Malades)	MARIE J.
Clinique médicale propédeutique (Broussais)	JUSTIN-BESANCON L.
Clinique médico-sociale du diabète sucré et des maladies de la nutrition (Hôtel-Dieu)	DEROT M.
Clinique de neuro-chirurgie (Pitié)	DAVID M.
Clinique neurologique (Salpêtrière)	GARCIN R.
Cliniques obstétricales (Baudelocque)	LACOMME M.
Cliniques obstétricales (Saint-Antoine)	MERGER R.
Clinique obstétricale et gynécologique (Port-Royal)	VARANGOT J.
Clinique ophalmologique (Hôtel-Dieu)	OFFRET G.
- - (Cochin)	BREGEAT P.
Clinique oto-rhino-laryngologique (Lariboisière)	AUBRY M.
Clinique de pédiatrie	MOZZICONACCI
Clinique de pédiatrie et de puériculture (St-Vincent de Paul)	THIEFFRY S.
Clinique de pneumo-phtisiologie (Laennec)	BERNARD E.
Clinique de neuro-psychiatrie infantile (Salpêtrière)	MICHAUX L.
Clinique de rhumatologie médicale et sociale (Cochin)	COSTE F.
Clinique stomatologique (Salpêtrière)	DECHAUME M.

Clinique thérapeutique chirurgicale (Vaugirard)	ROUX M.
Clinique thérapeutique médicale (Saint-Antoine)	LEMAIRE A.
Clinique toxicologique	GAULTIER M.
Clinique traumatologique et orthopédique (R. Poincaré)	JUDET R.
Clinique urologique (Cochin)	ABOULKER P.
- - (Necker)	COUVELAIRE R.
Hygiène et clinique de la première enfance (Trousseau)	LAPLANE R.
Séméiologie médicale (A. Chantin)	DOMART A.
- - (Lariboisière)	BOUVRAIN Y.
- - (Pitié)	RAMBERT M.
- - (Tothschild)	WELFROMT R.
Séméiologie et clinique chirurgicale (Broussais)	POILLEUX F.

b) Professeurs à titre personnel

Hématologie	ANDRE R.
Hydrologie et climatologie	BOUSSER J. GIBERTON A.
Maladies infectieuses	BASTIN R.
Médecine	AZERAD E. BOUR H. GROSSIORD A. LAMBLING A. LAUNAY Cl. PAYET M. PERRAULT M. SIGUIER F. WORMS R.
Neuro-chirurgie	LEBEAU J.
Neurologie	LHERMITTE F.
Neuro-psychiatrie	PICHOT P.
Oto-rhino-laryngologie	MADURO R.
Pédiatrie	POLONOVSKI Cl. ROYER P.
Pneumo-phtisiologie	KREIS B. MEYER A.
Rhumatologie	DELBARRE F.

II PROFESSEURS SANS CHAIRE

Anatomie pathologique	GOUYGOU Ch.
Anesthésiologie	VOURC'H G.
Bactériologie	CHRISTOL D.
Biochimie médicale	CARTIER P. GONNARD P.
Biologie médicale	HARTMANN L.
Hématologie	BILSKI PASQUIER
Maladies infectieuses	DUPONT V.
Physique médicale	COURSAGET J. GREMY F.
Physiologie	GIRARD Fr.

Stomatologie.....	CHAPUT Mme A.
Thérapeutique.....	CHASSAGNE P.

III PROFESSEURS DETACHES

DANS LES UNIVERSITES ETRANGERES

Bactériologie.....	HAUDUROY P. s. ch.
Pathologie chirurgicale.....	RUDLER J. s. ch.

IV PROFESSEUR ASSOCIE

Statistique médicale et épidémiologique.....	SCHWARTZ D.

Secrétaire général de la Faculté.....	M. LENA J.
Conseillers administratifs.....	Melle CHAINTREUIL M. FAYE R.
Conservateur en Chef de la bibliothèque, Conservateur du Musée d'histoire de la médecine.....	M. le Docteur HAHN A.
Conservateurs.....	Melle DUMAITRE P. Melle LAURENT H. Melle LE NOIR G.
Bibliothécaires.	Mme CONTETJ. Mme FORGET J. Melle DUROYOY MF Melle ROBERGE D. Dr SCHILLER J.

o o o o o o o o o o o o o o o

A ma Femme

A mon Fils

A mes Parents

A mes Frères

A mes Beaux Parents

A tous mes Amis

A

Monsieur le Professeur Fl. DELBARRE

Professeur à la Faculté de Médecine de Paris

Médecin des Hopitaux de Paris.

qui nous a fait le grand honneur d'accepter la présidence de cette thèse.

Nous le prions d'agréer l'expression de notre respect.

A

Monsieur le Docteur P. GALMICHE

Médecin de l'Hopital de Neuilly

qui nous a guidé avec bienveillance et dont les conseils ont été précieux tout au long de ce travail.

Qu'il trouve ici l'expression de toute notre gratitude.

A nos maitres de la Faculté et des Hopitaux

A nos maitres d'Externat

- Docteur NARDI chirurgien des Hopitaux
- Professeur agrégé TOYER-ROZAT gynécologue accoucheur des hopitaux
- Professeur BOURGEOIS Médecin des Hopitaux, Professeur au Collège de Médecine
- Professeur DUPUY Médecin des Hopitaux, Professeur au Collège de Médecine
- Professeur RUBENS-DUVAL Médecin des Hopitaux professeur au Collège de Médecine
- Docteur GALMICHE Médecin de l'Hopital de Neuilly
- Professeur GARCIN Professeur à la Clinique Neurologique de la Faculté, Médecin des Hopitaux

qu'ils trouvent ici l'expression de notre respectueuse gratitude pour leur enseignement de chaque jour.

- I N T R O D U C T I O N -

L'Acide Méfénamique est une nouvelle substance anti-inflammatoire, anti-algique.

Après avoir énoncé les propriétés pharmacologiques du produit, nous rappellerons les devers travaux déjà effectués sur ce médicament, puis nous exposerons la série de 50 observations effectuées dans le service de Médecine Générale de l'Hopital de Neuilly (Dr. P. GALMICHE) sur des malades présentant un syndrome douloureux.

L'Acide Méfénamique ou acide 2 - 3 diméthyl phényl anthranilique a pour formule développée :



Peu soluble en milieu acide, il n'est résorbé que dans l'intestin grêle.

C'est 2 à 3 heures après l'administration que l'on obtient la concentration sanguine maxima, mais l'effet clinique se manifeste dès la première heure.

Concentrations dans le plasma de l'Acide Méfénamique libre à la suite de la prise orale de 1.000 mg. en une seule fois.



La Courbe montre les concentrations dans le plasma après l'administration orale de 100 mg. de Ponstan. Deux à trois heures après l'administration, les concentrations dans le plasma sont de l'ordre de 7 - 10 mcg/ml et au cours des trois heures suivantes se produit une chute rapide, les valeurs sont de 1 - 2 mcg/ml. 24 heures après la prise du médicament, on ne trouve plus que des traces de Ponstan dans le plasma.

L'Acide Méfénamique est éliminé (pour la plus grande part soit 95 % dans les urines) totalement en 24 heures.

L'Acide Méfénamique est une substance anti-inflammatoire, antalgique, comme tel il a été commercialisé en Suisse sous le nom de Ponstan.

Bien étudié aux Etats-Unis par Cass et Frédérik (1), Winter et Coll (2), l'Acide Méfénamique est considéré comme un produit anti-inflammatoire et d'autre part comme un antalgique qui agirait directement, en plus de l'action antalgique résultant du pouvoir anti-inflammatoire.

Le Professeur Fl. Delbarre a procédé à une expérimentation animale.

Cette expérimentation a montré que l'Acide Méfénamique agissait de façon significative sur les premiers temps de l'inflammation, s'apparentant ainsi à la Phénylbutazone et aux pyrazolés, alors que, l'essai sur les temps ultérieurs ne donnait pas de résultats significatifs.

Cet antalgique anti-inflammatoire n'est ni un sédatif, ni un corticoïde paraît donc être une acquisition intéressante se rapprochant par ses propriétés pharmacologiques de la Phénylbutazone.

Son action thérapeutique est certaine comme le prouvent les résultats des importants travaux américains :

Une étude comparative de l'Acide Méfénamique et d'un placébo sur plus de 4.500 observations faites sur 299 patients montre une différence significative en faveur de l'Acide Méfénamique; la supériorité de ce produit sur l'Acide Acétylsalicylique a été prouvée chez 154 malades (2.814 observations individuelles.

Les auteurs américains estiment que 0,250 g d'Acide Méfénamique sont supérieurs à 0,600 g d'Aspirine, équivalent à 0,050 g de Codéïne ou a 0,050 g de Phénylbutazone.

Il n'y a pas d'accoutumance à la drogue qui ne provoque aucune assuétude et l'arrêt brusque de la thérapeutique peut se faire sans dommage. Il n'y a pas d'effets secondaires même après traitement de longue durée (12 mois). Son action antalgique paraît nette sur les douleurs post-opératoires, post partum, les extractions dentaires et les céphalées.

L'etude de l'Acide Méfénamique a été reprise en France tant sur le plan toxicologique que sur celui de la thérapeutique générale par le Pr. Gaultier et antirhumatismale par le Pr. Fl Delbarre.

Ils ont donné l'un et l'autre des conclusions favorables, notant la bonne tolérance du produit, mis à part quelques incidents digestifs mineurs, et une efficacité certaine sur le plan antalgique tant expérimental (test de Sigmeud à la Phénylbenzoquinone) que cliniquement.

Le Pr. Delbarre a obtenu des résultats appréciables dans les rhumatismes inflammatoires graves.

A leur suite, dans le Service du Dr. Galmiche, nous avons, après avoir pris connaissance des divers travaux publiés ou inédits consacrés à l'Acide Méfénamique, entrepris l'étude de son effet antalgique sur le plan purement clinique, laissant de côté l'étude de son action anti-inflammatoire bien établie.

L'étude de l'Acide Méfénamique s'est effectué sur les malades du Service de Médecine Générale de l'Hopital de Neuilly tant hospitalisés qu'ambulatoires, présentant des affections très diverses toutes douloureuses, allant des céphalées banales jusqu'aux polyarthrites rhumatoïdes sévères. Tous ces malades étaient adultes et l'on n'a administré le produit à aucune femme enceinte.

Forts des expérimentations passées insistant sur la bonne tolérance du produit, nous avons pu étudier son inocuité lors d'associations pathologiques diverses (polyarthrites rhumatoïdes, ulcères etc...)

Nous nous sommes servi de la présentation commerciale habituelle à l'étranger, c'est à dire des capsules contenant chacune 0,250 g de produit actif.

Le produit a été donné per os, également réparti dans le Nycthémère. L'Acide Méfénamique a parfois été prescrit d'emblée, parfois en substitution à un autre antalgique (ce qui permettait une comparaison) parfois associé à d'autres thérapeutiques antalgiques ou anti-inflammatoires.

Nous avons parfois procédé à des arrêts thérapeutiques de un à plusieurs jours afin de vérifier que l'amélioration observée était bien imputable à l'Acide Méfénamique.

Les effets cliniques ont été appréciés, après interrogatoire minutieux du malade, d'après l'amélioration fonctionnelle, la diminution du syndrome douloureux, la reprise de l'activité professionnelle.

Certains de ces malades étaient traités par d'autres produits (Phénylbutazone, corticoïdes etc...) et nous nous sommes efforcés de voir dans quelles mesures l'Acide Méfénamique permettait de baisser la dose efficace de ces produits, parfois mal tolérés, voir même de les remplacer.

La tolérance a été appréciée par l'interrogatoire et par les signes cliniques, voir même par des contrôles biologiques et radiologiques.

Les résultats ont été classés en 3 rubriques

- bons
- incertains ou moyens
- nuls

Dans la première rubrique sont mentionnés les malades qui ont, sans conteste, été totalement ou à 70 % améliorés.

Dans le rubrique "incertains ou moyens" les malades peu améliorés ou dont les résultats pouvaient être discutés du fait de l'association à une autre thérapeutique.

o o o o o o o o o

- A R T H R I T E S -

- O B S E R V A T I O N N° H.7.715 -

DRO... Aline, femme, 65 ans

- Coxite bi-latérale et prédominance droite avec douleur à maxima nocturne et impotence fonctionnelle - obésité.

- Un traitement fait en ville, constitué par thiodérazine Rumalon avait été sans effet.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique
- Résultat nul
- bonne tolérance

AU TOTAL

- Echec devant cette coxite
- Bonne Tolérance
- Dose journalière 1 gramme
- Nombre de jours de traitement 11
- Nombre de grammes prescrits 11

o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 5.899 -

BLA... Robert, homme, 54 ans

- Polyarthrite rhumatoïde assez sévère et pleurésie rhumatoïde avec signes inflammatoires importants, surtout au niveau des genoux.

- L'Indométhacine (1 gramme par jour) était mal toléré et l'on ne pouvait descendre au-dessous de cette posologie.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique
- réduction progressive des doses d'Indométhacine
- tolérance excellente
- l'Acide Méfénamique permet de ramener les doses d'Indométhacine à 0,50 gramme par jour, qui à cette dose est bien supporté.

AU TOTAL

Polyarthrite rhumatoïde avec pleurésie rhumatoïde tolérance excellente, l'Acide Méfénamique a permis de baisser le seuil d'efficacité de l'Indométhacine et donc d'éviter les intolérances thérapeutiques.

- Bon résultat
- Dose journalière 1 gramme
- Nombre de jours de traitement 43
- Nombre de grammes prescrits 43

o o o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° C 4.307 -

FRA... Germaine, femme, 61 ans

- Polyarthrite rhumatoïde ayant débuté sous la forme d'un rhumatisme palindromique.

- Devant l'effet nul des antimalariques et l'intolérance à l'Indométhacine

on prescrit :

- 0,750 g d'Acide Méfénamique
- Effet nul
- Gastralgies banales
- Interruption du traitement

AU TOTAL

- Polyarthrite rhumatoïde non améliorée par l'Acide Méfénamique
- Intolérance mineur = gastralgies
- dose quotidienne 0,750 g
- nombre de jours de traitement 6
- nombre de grammes prescrits 4,50

o o o o o o o o o

- OBSERVATION N° H 7.429 -

FIN... Jawen, homme, 72 ans

- hospitalisé pour bilan d'une coxite bi-latérale survenue au décours d'une prostatectomie.

- on note : douleurs importantes, limitation marquée de tous les mouvements des deux hanches avec une impotence fonctionnelle quasi totale.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique par jour

- effet bon : diminution des douleurs, augmentation du périmètre de marche.

- tolérance excellente malgré une volumineuse hernie hiatale.

AU TOTAL

- Coxite bi-latérale très améliorée par 1 gramme par jour d'Acide Méfénamique.

- Tolérance excellente malgré une hernie hiatale

- Nombre de jours de traitement 40

- Nombre de grammes prescrits 40

o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 4.335 -

GEI.... Louise, femme, 62 ans

- Polyarthrite rhumatoïde sévère avec coxite bi-latérale, prise des coudes, des poignets et des métacarpo-phalangiennes, sans cellules L E.

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique pendant 30 jours
- bonne tolérance
- effet nul selon la malade, mais une recrudescence des douleurs coïncide avec l'arrêt du traitement.

AU TOTAL

- résultat nul
- bonne tolérance
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours de traitement 30
- nombre de grammes prescrits 22,50

o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.437 -

DAY... Emilie, femme, 60 ans

- Polyarthrite rhumatoïde sévère avec complications de la corticothérapie au long cours :
  - diabète sucré et pyodermite
  - faciès cushingoïde
  - ostéoporose débutante
- Il était intéressant d'essayer de diminuer les doses de paramétasone.

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique
- bonne tolérance
- effet nul, très nettement inférieur à celui de l'Aspirine, et l'Acide Méfénamique ne permet pas de baisser la dose de paramétasone.

AU TOTAL

- polyarthrite rhumatoïde sévère non améliorée par l'Acide Méfénamique
- bonne tolérance
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours de traitement 19
- nombre de grammes prescrits 14,250

o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.487 -

BAR... Mariette, ferme, 27 ans

- Polyarthrite récente : rhumatisme subaigu post-angineux ou polyarthrite rhumatoïde débutante, disgnostic le plus probable mais non certain
- signes inflammatoires importants au niveau des genoux et du poignet droit
- traitée par antibiotiques, cette malade n'est que peu améliorée. C'est pourquoi on associe 1 gramme d'Acide Méfénamique
- tolérance excellente
- effet douteux
- l'Indomathécine prescrit entraîne alors une amélioration nette.

AU TOTAL

- effet douteux sur une polyarthrite indéterminée
- bonne tolérance
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 33
- nombre de grammes 33

o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.390 -

BRO... Marie Antoinette, femme, 56 ans

- Polyarthrite rhumatoïde débutante avec localisation prédominante au niveau des poignets et des coudes.

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique
- l'effet du produit est lent à se manifester. Au 15° 20 ° jour du traitement la malade signale une amélioration de la mobilité de ses articulations, ainsi qu'une diminution des douleurs.
- la malade manquant de produit pendant 5 jours, on note une rechute, de nouveau sensible à la reprise du traitement.

AU TOTAL

- polyarthrite rhumatoïde débutante améliorée par l'Acide Méfénamique
- tolérance excellente
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours de traitement 70
- nombre de grammes prescrits 52,500

o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.567 -

INS... Vincent, homme, 62 ans

- Est hospitalisé pour un rhumatisme post-angineux de l'adulte mais dont certains caractères cliniques font craindre une évolution vers la polyarthrite rhumatoïde.

- Le syndrome inflammatoire est très important, avec douleur marquée, impotence fonctionnelle des articulations atteintes et hydarthrose des 2 genoux.

- cette polyarthrite touche :

  - les pieds
  - les genoux
  - les mains (articulations inter-métacarpophalangiennes)

- elle s'accompagne d'une température à 39°

- l'antibiothérapie ramène la température à la normale mais les signes articulaires persistent.

- 1,500 gramme d'Acide Méfénamique amènent progressivement une diminution du syndrome inflammatoire.

- la reprise de l'Acide Méfénamique amène la même amélioration.

AU TOTAL

- très bon résultat chez cette polyarthrite rhumatoïde
- tolérance excellente
- dose journalière 1,500 gramme
- nombre de jours de traitement 27
- nombre de grammes prescrits 40,500

o o o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.168 -

KNA... Marcel, homme, 64 ans

- Hospitalisé pour un tableau clinique évoquant une spondylarthrite ankylosante, en période de poussée inflammatoire douloureuse se manifestant essentiellement au niveau

  - du rachis lombaire
  - des articulations sacro-iliaques
  - des genoux (hydarthrose)

  et s'accompagnant d'une importante impotence fonctionnelle.

- Dans l'attente du diagnostic précis de cette affection

  on prescrit

  - 1 gramme d'Acide Méfénamique par jour
  - amélioration rapide
  - au 3° jour, arrêt du traitement pendant 2 jours recrudescence des signes douloureux et de l'impotence
  - reprise du traitement : de nouveau la symptomatologie s'atténue.
  - le traitement constitué par 1,250 g d'Acide Méfénamique est poursuivi en ambulatoire au 15° jour
  - au 45° jour soit après 30 jours de traitement ambulatoire l'effet de l'Acide Méfénamique se maintient nettement supérieur à l'Aspirine et permet une activité professionnelle.
  - 15 jours plus tard l'Acide Méfénamique (1,250 g) est toujours supérieur à l'Aspirine (2,500 g) mais est insuffisant pour calmer cette nouvelle poussée.
  - on prescrit alors 1 gramme d'Acide Méfénamique et une antibiothérapie.

- 30 jours plus tard très amélioré par ce traitement le malade ne souffre plus et mène une vie professionnelle normale.

AU TOTAL

- 1.250 gramme d'Acide Méfénamique ont toujours été supérieurs a 2,500 gramme d'Aspirine et ont suffi à équilibrer cette spondylarthrite ankylosante.

- un arrêt du traitement pendant 2 jours a provoqué une rechute. La reprise de l'Acide Méfénamique à permis le même succès thérapeutique.

- tolérance excellente

- notre impression est que l'effet antalgique a été supérieur à l'effet anti-inflammatoire

- dose journalière 1,250 gramme

- nombre de jours de traitement 56

- nombre de grammes prescrits 78,50

o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.500 -

PAR... Lucie, femme, 84 ans

- Polyarthrite rhumatoïde peu évolutive, touchant les poignets et les doigts, douloureuse, peu inflammatoire

- cholécystite

- la dose de 1 gramme d'Acide Méfénamique entraîne une diminution des douleurs et la mobilité articulaire est améliorée.

- tolérance excellente malgré la cholécystite

- bon résultat

AU TOTAL

- bon résultat chez cette polyarthrite rhumatoïde peu évolutive
- tolérance excellente
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 8
- nombre de gramme prescrits 8

o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.477 -

SUA... Noémie, femme, 77 ans

- Polyarthrite rhumatoïde peu évolutive, récente, du sujet âgé, Envoyée dans le service pour équilibre d'une poussée inflammatoire des genoux, des poignets et du coude droit.

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique par jour, en association avec des corticoïdes que l'on essaye de diminuer grâce à l'Acide Méfénamique, mais sans succès
- Tolérance excellente

AU TOTAL

- effet nul chez cette polyarthrite rhumatoïde peu évolutive
- tolérance excellente
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours de traitement 12
- nombre de grammes 9

o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H. 1.180 -

TCH... Reyna femme 58 ans

- Polyarthrite rhumatoïde ancienne, sévère, posant des problèmes thérapeutiques en raison d'un volumineux ulcère de l'estomac qui contre-indique les corticoïdes.
- l'Aspirine per os n'est pas supportée
- les antimalariques sont sans effet
- l'effet de la chrysothérapie est épuisé depuis longtemps.
- l'Indométhacine n'est pas tolérée ainsi d'ailleurs que la Glaphénine qui est sans effet.
- le seul traitement admis par cette malade consiste en des suppo-aspirine n'amenant que peu de soulagement lors des poussées.

TRAITEMENT

- d'abord : suppo-aspirine 2 grammes
  Acide Méfénamique 0,500 gramme
- puis Acide Méfénamique 1 gramme
  corticoïdes intra-articulaires.
- amélioration des signes inflammatoires
- tolérance excellente
- le traitement est poursuivi en ambulatoire.

AU TOTAL

- bon résultat chez cette polyarthrite rhumatoïde ancienne, sévère, aux multiples contre-indications thérapeutiques.
- bonne tolérance
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 94
- nombre de grammes prescrits 94

o o o o o o o o o o o o

- OBSERVATION -

THE.... Hélène, femme, 65 ans.

- Polyarthrite rhumatoïde, traitée sans succès en ville par Phénylbutazone et aspirine, puis par 0,020 gramme de Prednisone.

- Entre dans le service en poussée inflammatoire touchant, coude droit, poignets et métacarpo-phalangiennes.

TRAITEMENT

- 1,500 gramme d'Acide Méfénamique pendant 12 jours, période pendant laquelle on essaye de baisser la dose de Prednisone pour arriver à 2 grammes d'Acide Méfénamique et 0,002 gramme de Prednisone.

- infiltrations de corticoïdes dans les articulations

- tolérance excellente

- amélioration de la poussée.

- Anoter que les antécédents récents de Méléna imposaient une certaine prudence quant au maniement des corticoïdes.

AU TOTAL

- 1,500 gramme d'Acide Méfénamique puis 2 grammes ont permis de baisser chez cette polyarthrite rhumatoïde en pleine poussée inflammatoire la dose de Prednisone de 0,020 gramme à 0,002 sans inconvénients, et nous ont permis d'obtenir une amélioration.

- bonne tolérance
- dose quotidienne 1,5 gramme puis 2 grammes
- nombre de jours de traitement 27
- nombre de grammes prescrits 48

o o o o o o o o o o o

- OBSERVATION N° H 7.789 -

VOI... Pierre, homme, 54 ans

- spondylarthrite ankylosante sévère en poussée avec blocage des épaules, des genoux, du rachis et surtout des hanches
- l'Indométhacine n'est pas tolérée, et le Tandéril est insuffisant.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique associé à 0,600 gramme de Phénylbutazone I M
- Résultat nul sur le blocage articulaire, douteux sur les douleurs.
- l'unique traitement en période de crise chez ce malade coopérant, qui s'analyse bien, reste la corticothérapie intra-articulaire qui diminue le syndrome douloureux et permet un déblocage partiel des articulations.
- arrêt du traitement
- reprise du traitement en fin de crise : effet nul
- bonne tolérance

AU TOTAL

- échec dans ce cas de spondylarthrite ankylosante sévère
- bonne tolérance
- dose journalière 0,500 puis 1 gramme
- nombre de jours de traitement 21
- nombre de grammes prescrits 20

o o o o o o o o o o o o o

- R A D I C U L A L G I E S -

- O B S E R V A T I O N N° H 8.603 -

MAR... Clara, femme, 63 ans

- Sciatique L 5 gauche paralysante et ostéoporomalacie survenant chez une femme opérée d'un cancer du sein il y a 15 ans.

- pendant l'exploration de cette malade,

ON PRESCRIT :

- 1 gramme d'Acide Méfénamique pendant 6 jours puis 1,500 gramme associé au repos strict sur plan dur.

- bons résultats sur la symptomatologie douleurouse

- devant la persistance de la parésie radiculaire L 5 on pratique une infiltration intra-rachidienne de corticoïdes qui amène la guérison.

- vers le 30 ° jour du traitement chez cette malade présentant une achlorhydrie et une colite apparaît une intolérance à type de :

  - nausées sans vomissement
  - diarrhée

  cèdant à l'arrêt du traitement.

AU TOTAL

- bon résultats de l'Acide Méfénamique sur les douleurs sciatiques de cette malade

- intolérance au 30° jour cèdant à l'arrêt du traitement

- dose journalière 1 gramme puis 1,500

- nombre de jours de traitement 37

- nombre de grammes prescrits 52,500

- O B S E R V A T I O N N° H 8.527 -

LAL..... Pauline, femme, 65 ans

- sciatique d'intensité modérée et d'organicité discutable, et nodules de fibrosite.

- le syndrome douloureux lié aux nodules de fibrosite disparait rapidement après 2 infiltrations

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique par jour associé au repos qui est mal suivi.

- résultat douteux d'interprétation malaisée.

- la malade sort guérie.

AU TOTAL

- résultat douteux pour cette sciatique d'intensité moyenne.

- bonne tolérance

- dose journalière 1 gramme

- nombre de jours de traitement 11

- nombre de grammes prescrits 11

o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.479 -

TAH.... Ankrane, homme, 50 ans

- Sciatique d'intensité modérée.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique par jour associé au repos strict.
- bons résultats
- tolérance excellente

AU TOTAL

- amélioration d'une sciatique modérée par 1 gramme d'Acide Méfénamique et du repos.
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 15
- nombre de grammes prescrits 15

o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° C 8.456 -

FER... Germaine, femme, 68 ans

- Névralgies Cervico-Brachiales

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique
- massages et élongations
- effet moyen incomplet 0,750 gramme d'Acide Méfénamique faisant le même effet qu'un gramme d'Aspirine
- la malade se plaint de gastralgies acides, cèdant à l'arrêt de l'Acide Méfénamique

AU TOTAL

- intolérance minime (gastralgies acides) cèdant à l'arrêt de l'Acide Méfénamique
- effet moyen incomplet sur les névralgies cervico-brachiales
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours de traitement 15
- nombre de grammes prescrits 11,250

o o o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.308 -

LOZ... Christiane, femme, 37 ans

- Névralgies cervico-brachiales liées à une carvicarthrose importante.
- le syndrome douloureux est intense.

TRAITEMENT

- 0,500 gramme d'Acide Méfénamique associé à du Carisoprodol
- effet nul, on associe alors des élongations prudentes.
- guérison
- tolérance excellente
- effet incertain, moins actif sur la douleur que le Nubalgyl
- arrêt du traitement.

AU TOTAL

- névralgies cervico-brachiales non améliorées par l'Acide Méfénamique
- bonne tolérance
- dose journalière 0,500 gramme
- nombre de jours de traitement 11
- nombre de grammes prescrits 5,500

o o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.328 -

DEW... Jeanne, femme, 70 ans

- Névralgies Cervico-brachiales, cervicarthrose, possibilité de myélopathie discocervicarthrosique

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique
- tolérance excellente
- effet nul ainsi du reste que le traitement associé : décontracturant, infiltrations, aspirine, seul le Nubalgyl et les massages semblent avoir quelque effet.
- arrêt du traitement

AU TOTAL

- névralgies cervico-brachiales non soulagées entre autre par l'Acide Méfénamique.
- bonne tolérance
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours de traitement 17
- nombre de grammes prescrits 12,750

o o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.669 -

MIC... Narcisse, homme, 57 ans

- Sciatalgies, infarctus récent, ulcère gastrique.

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique
- effet nul
- tolérance excellente.

AU TOTAL

- effet nul
- très bonne tolérance malgré les multiples contre-indications thérapeutiques.
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours 5
- nombre de grammes 3,750

o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.417 -

MOL.... L$_u$cien, homme, 33 ans

- Sciatique paralysante trainante consécutive à un accident du travail.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique par jour pendant 9 jours sans résultat.
- 1'I$_n$tra-rachidienne de Corticoïdes provoque une amélioration fulgurante.

AU TOTAL

- résultat nul	
- bonne tolérance	
- dose journalière	1 gramme
- nombre de jours	9
- nombre de grammes	9

o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.418 -

DEN..... Antoinette, femme, 34 ans

- Sciatique bi-latérale liée à un cordon veineux périnédulaire de découverte opératoire.

- douleur intense

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique
- repos
- effet douteux
- bonne tolérance

AU TOTAL

- résultat douteux
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 6
- nombre de grammes prescrits 6

o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.534 -

DEN..... Brigitte, femme 25 ans

- Sciatique modérée trainante, peu améliorée par le repos au lit et divers antalgiques.

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique
- Carisoprodol
- I_n filtrations des trous sacré
- amélioration dont il est difficile de dire ce qui revient à l'Acide Méfénamique. Il semble que les corticoïdes en épidurales soient les responsables de cette amélioration.
- bonne tolérance.

AU TOTAL

- action douteuse de l'Acide Méfénamique
- bonne tolérance

- dose journalière	0,750 gramme
- nombre de jours de traitement	9
- nombre de grammes prescrits	6,750

o o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.425 -

ROD .....José, homme, 30 ans

- Sciatique S1 droite trainante avec hémisacralisation droite de L5

- traitée sans résultat en ville par Phénylbutazone, aspirine, corticoïdes per os.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique par jour pendant 12 jours avec un résultat moyen; seul l'association avec le Carisoprodol et surtout les infiltrations des trous sacrés permettent d'obtenir la guérison.

- le traitement est poursuivi en ambulatoire avec 1 gramme d'Acide Méfénamique par jour : Rechute.

- réhospitalisé le malade guérit avec une association thérapeutique classique et des infiltrations.

AU TOTAL

- résultat moyen, puis nul du Ponstyl sur une sciatique trainante.

- bonne tolérance

- dose journalière 1 gramme

- nombre de jours de traitement 27

- nombre de grammes prescrits 27

o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.406 -

IDJ... Idis, homme, 32 ans

- Sciatique S1 avec douleurs d'intensité moyenne

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique
- Carisoprodol
- repos strict au lit sur matelas dur
- amélioration
- effet moyen
- traitement poursuivi en ambulatoire pendant 15 jours
  - effet moyen
  - bonne tolérance.

AU TOTAL

- effet moyen sur cette sciatique. Comme toutes les sciatiques il est difficile de faire la part de ce qui revient aux antalgiques ou au repos strict.
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 22
- nombre de grammes prescrits 22

o o o o o o o o o o o o o

- A R T H R O S E S -

- O B S E R V A T I O N N° H 8.457 -

MAN... Marie, femme, 41 ans

consulte pour :
- lombalgies liées à un pincement L5 S1
- cervicalgies liées à une discarthrose cervicale
- talalgies gauches

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique par jour
- tolérance excellente
- amélioration nette des douleurs au bout de 15 jours de traitement
- à noter qu'un traitement par un antalgique non identifié, per os, associé à de la pommade à la Phénylbutazone et à des massages avait été inéfficace.

AU TOTAL

- effet favorable de l'Acide Méfénamique chez cette malade présentant cervicalgies, lombalgies et talalgies.
- tolérance excellente
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours de traitement 15
- nombre de grammes prescrits 11,250

o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° C. 8.454 -

DAU... Mauricette, femme, 54 ans

- Gonarthrose modérée.
- obésité.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique par jour,
- 1 infiltration faite immédiatement
- régime
- effet bon
- l'amélioration s'est manifesté en 3 jours, l'effet est supérieur à celui obtenu avec 1,500 gramme d'Aspirine pendant 15 jours.
- tolérance excellente
- traitement anbulatoire poursuivi.

AU TOTAL

- gonarthrose améliorée par l'Acide Méfénamique
- tolérance excellente
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 15
- nombre de grammes prescrits 15

o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° C 7.908 -

NEY... Carmen, femme, 76 ans

- Cervicarthrose avec limitation importante des mouvements du cou
- Gonarthrose avec douleurs de type mécanique
- effet nul du traitement comprenant :

  - massages
  - Coltramyl
  - Métaspirine

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique associé à des massages

deus mois plus tard :

- légère amélioration de la mobilisation du rachis cervical
- l'Acide Méfénamique soulage la malade mais incomplètement, moins que l'Aspirine, mais alors que l'Acide Acétylsallycilique provoquait des gastralgies, l'Acide Méfénamique est bien toléré.

AU TOTAL

- cervicarthrose améliorée par l'Acide Méfénamique
- résultat moyen
- bonne tolérance
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours de traitement 57
- nombre de grammes prescrits 42,750

o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.452 -

TET... Marie Louise, femme, 67 ans

- Coxarthrose bi-latérale importante et pyélonéphrite.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique par jour.
- effet nul ainsi d'ailleurs que l'Aspirine.
- la solution est chirurgicale mais la malade refuse l'intervention.

AU TOTAL

- échec
- bonne tolérance
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 14
- nombre de grammes 14

o o o o o o o o o o o o o o

- PERIARTHRITES SCAPULO-HUMERALES -

- O B S E R V A T I O N N° C.8.432 -

POC... Jean, homme, 74 ans

- Périarthrite scapulo- humérale

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique par jour, associé à des massages
- amélioration nette des douleurs, ce résultat persiste à l'arrêt du traitement.
- tolérance excellente.

AU TOTAL

- effet bon
- tolérance excellente
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours de traitement 12
- nombre de grammes prescrits 9

o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.434 -

BOU... Saïd, homme, 46 ans

- Périarthrite scapulo-humérale et Ulcus bulbaire.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique par jour
- effet moyen sur les douleurs scapulaires
- tolérance excellente malgré l'ulcère.

AU TOTAL

- très bonne tolérance chez ce malade présentant un Ulcus
- résultat moyen sur la périarthrite scapulo-humérale
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 12
- nombre de grammes 12

o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.412 -

LAR... Anne Marie, femme, 76 ans

- Périarthrite scapulo-humérale droite avec limitation douloureuse des mouvements et syndrome douloureux abdominal (lithiase vésiculaire).

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique par jour.
- résultats très modestes sur la douleur
- tolérance excellente.

AU TOTAL

- effet médiocre sur cette Périarthrite scapulo-humérale
- tolérance excellente chez cette malade aux troubles dyspeptiques multiples.
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 8
- nombre de grammes prescrits 8

o o o o o o o o o o o o o

- C E P H A L E E S -

- O B S E R V A T I O N N° 001 -

GAY.... Annick, femme, 24 ans.

- Céphalées frontales intenses banales

TRAITEMENT

- 0,500 gramme d'Acide Méfénamique
- soulagement rapide en 3/4 d'heure, durable
- lors de plusieurs nouveaux épisode l'Acide Méfénamique se révèle également efficace.

AU TOTAL

- bon résultat
- bonne tolérance
- dose journalière 0,500 gramme
- nombre de jours de traitement 1
- nombre de gramme prescrits 0,500

o o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° 002 -

BAR... Annie, femme, 27 ans

- Céphalées diffuses banales

TRAITEMENT

- 0,500 gramme d'Acide Méfénamique et deux heures plus tard 0,250 gramme
- amélioration rapide en 1 heure
- guérison en 2 heures.

AU TOTAL

- Bon résultat
- bonne tolérance
- dose d'attaque 0,500 gramme
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours de traitement 1
- nombre de gramme prescrits 0,750

o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° 003 -

BVI... Arnaud, homme, 27 ans

- Céphalées occipitales

TRAITEMENT

- 0,500 gramme d'Acide Méfénamique en une prise
- bon résultat
- bonne tolérance
- ce traitement est efficace à plusieurs reprises.

AU TOTAL

- bon résultat, supérieur à celui obtenu avec l'Aspirine (1 gramme)
- bonne tolérance
- dose journalière 0,500 gramme
- nombre de jours de traitement 1
- nombre de gramme prescrits 0,500

o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° 0 0 5 -

BEN... Betty, femme, 24 ans

- migraines cataméniales.

TRAITEMENT

- 1,500 gramme d'Acide Méfénamique par jour en trois prises
- bon résultat

AU TOTAL

- bon résultat
- bonne tolérance
- dose journalière 1,500 gramme
- nombre de jours de traitement 2
- nombre de grammes prescrits 3

o o o o o o o o o o

- D I V E R S -

- O B S E R V A T I O N N° H 8.564 -

CHA... Marcel, homme, 64 ans

- Entre dans le service pour des douleurs lombaires importantes survenant par accoup, sur un fond douloureux permanent peu intense de lombalgies.

- les clichés radiologiques montrent une ostéoporose rachidienne importante.

- A noter qu'un traitement bien conduit comprenant Aspirine , vitamine B1 et repos avait été sans effet.

- Pendant que les explorations sont mises en route,

ON PRESCRIT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique et le repos sur plan dur.

- amélioration nette au bout de 5 jours

- le diagnostic de Myélome dans sa forme décalcifiante est alors affirmé sur les données du médullogramme et l'électrophorèse.

- Afin de faire la part de l'Acide Méfénamique et du repos on arrête le traitement pendant 5 jours :

  - reprise du syndrome douloureux.

- la mise en route d'un traitement mixte comprenant :

  - Acide Méfénamique
  - Melphelan

  permet le même effet thérapeutique.

- tolérance excellente

- le malade est sorti poursuivant son traitement à domicile.

.../...

AU TOTAL

- bon résultat de l'Acide Méfénamique dans ce cas de douleurs radiculaires dues à une maladie de Kahler.
- bonne tolérance
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 30
- nombre de grammes prescrits 30

o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.548 -

COZ... Georges, homme, 69 ans.

- maladie de Horton avec douleurs temporales marquées.

- en attendant la biopsie de l'artère temporale

ON PRESCRIT

- 1,500 gramme d'Acide Méfénamique pendant 2 jours.
- bon résultat : les céphalées diminuent rapidement d'intensité.
- tolérance excellente

AU TOTAL

- bon résultat dans ce cas de maladie de Horton traitée en attente d'intervention, par l'Acide Méfénamique.
- dose journalière 1,500 gramme
- Nombre de jours de traitement 2
- nombre de grammes prescrits 3

o o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.661 -

CON... Jules, homme, 77 ans

- Ostéïte ischio-pubienne survenant au décours d'une prostatectomie.

- douleur importante entrainant une impotence fonctionnelle notable.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique et repos.

- l'effet du produit est assez long à s'installer mais au bout de 8 à 10 jours, le malade commence à marcher.

- l'effet est plus net au 15° jour : les douleurs sont moins intenses et la marche est possible.

- un arrêt du traitement provoque une rechute.

- la reprise du traitement permet d'obtenir le même effet favorable.

- la tolérance a été excellente, hormis quelques gastralgies fugaces au début du traitement.

AU TOTAL

- ostéïte ischio-pubienne très améliorée par 1 gramme d'Acide Méfénamique par jour

- dose journalière 1 gramme

- nombre de jours de traitement 21

- nombre de grammes prescrits 21

o o o o o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.571 -

TRO... Jeanne-Marie, femme, 91 ans

- Ostéoporose sénile et lyse de la tête humérale droite, Polyalgies avec Rachialgies prédominantes.

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique
- effet médiocre, difficile à juger chez cette malade très âgée.
- tolérance excellente.

AU TOTAL

- effet médiocre
- tolérance excellente
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours de traitement 10
- nombre de grammes prescrits 7,500

o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 7.834 -

LAU... Jeanne, femme, 78 ans

- Ostéoporose sénile avec syndrome polyalgique, intolérances médicamenteuses multiples, psychisme très particulier.

- outre le classique traitement d'Albright,

ON PRESCRIT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique par jour pendant 15 jours.

- persistance du syndrome polyalgique.

- devant cet échec, passage à d'autres antalgiques sans plus de succès.

- la tolérance de l'Acide Méfénamique a été excellente, malgré les intolérances médicamenteuses nombreuses.

AU TOTAL

- échec devant un cas d'ostéoporose sénile polyalgique.
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours de traitement 15
- nombre de grammes prescrits 11,250

o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 5.824 -

CHA... Marie, femme, 69 ans

- Cancer du sein opéré, polymétastasé.
- la diffusion à tout le squelette est affirmé par les clichés radiologiques.
- le syndrome douloureux est très important, avec insomnie.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique, par jour, d'abord isolé, puis bien vite devant les résultats nuls, en association avec Aspirine, puis Salgydal, puis Nubalgyl etc....
- résultats nuls
- tolérance excellente

AU TOTAL

- métastases osseuses diffuses d'un cancer du sein
- résultat nul, isolé, ou en association
- seuls la Lévopromazine et les stupéfiants apportent un soulagement.
- Dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 15
- nombre de grammes prescrits 15

o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° H 8.529 -

MA... Marie Jeanne, femme, 61 ans

- vagues arthralgies

- douleurs épigastriques.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique pendant 10 jours.
- effet nul
- tolérance excellente malgré la présence d'une sigmoïdite et d'une dyskinésie vésiculaire.

AU TOTAL

- arthralgies sans substratum organique
- effet nul
- tolérance excellente malgré une dyskinésie vésiculaire et une sygmoïdite
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 10
- nombre de grammes prescrits 10

o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° C 8.365 -

COR... Andrée, femme, 76 ans

- douleur violente des deux pieds prédominant à gauche

- l'examen révèle une maladie de Morton bi-latérale avec pieds creux, érythrose plantaire et oedème.

- l'Aspirine a été sans effet.

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique par jour et le port de semelles orthopédiques.

- 12 jours plus tard la malade revient, certes l'érythrose et l'oedème sont maintenant discrets, mais les douleurs sont toujours aussi intenses.

- effet nul

AU TOTAL

- Morton

- effet nul

- tolérance excellente

- dose journalière 0,750 gramme

- nombre de jours de traitement 12

- nombre de grammes prescrits 9

o o o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° 006 -

VIR... Bernard, homme, 26 ans

- entorse du pouce

TRAITEMENT

- 0,500 gramme d'acide Méfénamique en une prise puis deux fois 0,250 gramme.

- bon résultat

- bonne tolérance

AU TOTAL

- bon résultat
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 2
- nombre de grammes prescrits 2

o o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° 00 4 -

FOU... Jean Jacques, homme, 27 ans

- douleurs après avulsion d'une dent de sagesse.

TRAITEMENT

- 0,500 gramme puis 0,250 gramme jusqu'à 1,500 gramme par jour.
- bon résultat
- bonne tolérance

AU TOTAL

- bon résultat	
- bonne tolérance	
- dose journalière	1,500 gramme
- nombre de jours de traitement	2
- nombre de grammes prescrits	3

o o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° 007 -

JEA... Berthe, femme, 24 ans

- dysménorrhée.

TRAITEMENT

- 1 gramme d'Acide Méfénamique
- résultat nul
- intolérance minime à type de nausées.

AU TOTAL

- échec
- intolérance
- dose journalière 1 gramme
- nombre de jours de traitement 2
- nombre de grammes prescrits 2

o o o o o o o o o o o o o o

- O B S E R V A T I O N N° C 8.509 -

KER... Monique, femme, 22 ans

- dysplasie de la hanchedroite avec douleurs marquées.

à l'examen on note :

- extention et rotations douloureuses et légèrement limitées.

TRAITEMENT

- 0,750 gramme d'Acide Méfénamique par jour, au bout de 10 jours la malade note une diminution importante du syndrome douloureux.
- un arrêt du traitement entraine une reprise des douleurs.
- cette malade revient 1 1/2 mois après et l'examen montre une hanche indolore et une mobilisation normale.
- tolérance excellente

AU TOTAL

- amélioration très nette dans ce cas de dysplasie de la hanche.
- tolérance excellente
- dose journalière 0,750 gramme
- nombre de jours de traitement 41
- nombre de grammes prescrits 30,750

o o o o o o o o o o o o o o

- C O M M E N T A I R E S -

Ont été traités 60 malades avec de l'Acide Méfénamique.

- 10 observations n'ont pas été retenues
  soit du fait de l'indiscipline de certains malades
  soit que certains de ces malades n'ont pas été revus

Nous pouvons donc faire état de :

- 50 observations interprétables
- 976 jours de traitement
- 987,250 grammes de produits employés.

Soit un traitement moyen de 20 grammes en 19 jours 1/2 par malade et une moyenne de 1 gramme par jour, par malade.

Le maxima de durée a été de 94 jours (observation n° H 1.180). Plusieurs malades ont eu plus de 50 jours de traitement (observation n° H 8.180).

des doses totales supérieures à 50 grammes ont été administrées (observations n° H 8.168 H 8.390 et H 8.603).

La dose minima quotidienne a été de 0,500 gramme, la dose maxima de 2 grammes.

Nous avons employé des doses variant en général entre 0,750 gramme et 1,500 gramme en 24 heures.

- T O L E R A N C E -

La tolérance clinique de l'Acide Méfénamique est bonne.

Sur 50 observations nous n'avons noté que 4 intolérances (soit 8%) d'ailleurs minimes.

.../...

Ainsi dans l'observation n° C 4.307 nous notons des gastralgies minimes pour une faible posologie (0,750 gramme de produit en 6 jours), mais c'est bien plus l'inefficacité de traitement que cette intolérance minime, cèdant rapidement à l'arrêt de la thérapeutique, qui fait cesser cette thérapeutique.

De même dans l'observation n° C 8.456 une discrète gastralgie acide est notée, cèdant à l'arrêt du traitement (0,750 gramme pendant 15 jours).

Dans l'observation n° 006 on note des nausées, la responsabilité de l'Acide Méfénamique, chez cette malade en période catamaniale n'ayant reçu qu'1 gramme de produit, paraît néanmoins douteuse.

Enfin dans l'observation n° H 8.603, nous notons une intolérance digestive à type de nausées, sans vomissement, et de diarrhée, apparaissant au 30° jour du traitement après 45,500 grammes d'Acide Méfénamique. Mais il faut noter que la malade présentait depuis longtemps une achlorhydrie et une colite.

Le traitement est poursuivi 7 jours en réduisant la posologie à 1 gramme quotidienne et en associant du bismuth. Les troubles ne cessent qu'après arrêt de l'Acide Méfénamique.

Il n'y a donc que 4 cas d'intolérance sur 50 observations, une intolérance nous paraît suspecte, 2 sont minimes et auraient permis la poursuite du traitement, 1 enfin, a imposé l'arrêt de la thérapeutique.

soit

- 2 % d'intolérance impérative
- 4 % de relative
- 2% de discutable.

Dans les 46 autres observations la tolérance a été bonne. Il faut remarquer qu'un certain nombre des malades présentait des tares préexistantes.

- ulcus (observation n° H 8.434, observation n° H 8.669) avec en outre un infarctus du myocarde (observation n° H 1.180)
- cholécystite et dyspepsie vésiculaire (observation n° H 8.500 et H 8.412 et H 8.529)
- hernie hiatale (observation n° H 7.429)
- une sygmoïdite (observation n° H 8.429), un méléna récent (observation THE...).

Aucun n'a allégué une intolérance quelconque et la surveillance clinique et para-clinique n'a fait que confirmer cette opinion.

Il faut aussi noter que dans 8 observations une intolérance à d'autres antalgiques avait été observée et que tous ces malades ont bien supporté l'Acide Méfénamique.

Il faut aussi remarquer que ces malades avaient déjà été traités par de nombreux médicaments considérés comme agressifs, et que ces conditions auraient pû faciliter le développement d'intolérances à l'Acide Méfénamique : il n'en a rien été, et les contre-indications de l'Acide Méfénamique, autant que l'on puisse en juger sur 50 observations et pour un traitement de durée moyenne, semblent donc très limitées. Dans notre série seuls les troubles intestinaux pré-existants semblent être responsables d'intolérances, d'ailleurs sans gravité, et cèdant à l'arrêt de la thérapeutique.

- EFFETS CLINIQUES -

- 50 observations ont été recueillies.

Il est intéressant d'étudier l'efficacité de l'Acide Méfénamique en fonction des affections traitées.

I - ARTHRITES -

- 15 observations ont été recueillies (tableau n° 1)

soit - 11 polyarthrites rhumatoïdes
- 2 spondylarthrites ankylosantes
- 2 arhtrites infectieuses (coxite bi-latérale)

Les polyarthrites rhumatoïdes étaient à des dégrés évolutifs très variables allant (observation n° H 8.487 BAR...) des polyarthrites rhumatoïdes récentes jusqu'aux polyarthrites rhumatoïdes anciennes (observation n° H 1.180 TCH...) des polyarhtrites rhumatoïdes peu évolutives (observation n° H 8.500 PAR...) jusqu'aux polyarthrites rhumatoïdes sévères (observation n° H 8.437 DAY...).

- RHUMATISMES INFLAMMATOIRES -

tableau N° 1

DIAGNOSTIC	NOMBRE DE CAS	RESULTATS			TOLERANCE	
		bon	Incertain	nul	bonne	mauvaise
Polyarthrite rhumatoïde						
débutantes	4	3	1	-	4	-
moyennes	3	1	-	2	2	1
anciennes	4	2	-	2	4	-
SPA	2	1	1	-	2	-
Coxite	2	1	-	1	2	-
		8	2	5	14	1
	15	(		)	(	)
			15		15	

Sur les 11 polyarthrites rhumatoïdes nous notons :

- 6 bons résultats
- 1 résultat incertain
- 4 nuls.

Il semble que les polyarthrites rhumatoïdes débutantes soient plus sensibles à l'Acide Méfénamique :

Sur 4 observations :

- 3 bons résultats
- 1 résultat incertain

.../...

Le problème qui est posé fréquemment dans cette étude a été celui de savoir dans quelle mesure l'hormonothérapie pouvait être réduite grâce à l'acide méfénamique. Il a été parfois difficile de conclure quelque soit la rigueur de l'observation, les rémissions spontanées ou l'action du repos jouaient un rôle négligeable.

Aussi dans l'observation THE..., la prescription de 1,500 grammes puis de 2 grammes d'Acide Méfénamique a permis de baisser les doses de Prednisone de 0,020 gramme à 0,002 gramme. Cette baisse de posologie était d'autant plus souhaitable que le malade avait des antécédents récents de Méléna.

Dans l'observation n° H 8.437 DAY..., au contraire, l'Acide Méfénamique n'a été d'aucun secours et les doses de corticoïdes par voie générale n'ont pu être diminuées.

Dans l'observation n° H 5.899 BLA..., la prescription de 1 gramme d'Acide Méfénamique permit de ramener la dose de 1 gramme d'Indométhacine (mal tolérée) à 0,500 gramme, bien tolérée à cette dose.

Quatre des polyarthrites rhumatoïdes ont été traitées d'emblée par l'Acide Méfénamique.

Il s'agissait de 3 polyarthrites rhumatoïdes récentes 2 succès (observations n° H.8390 et H. 8.567), 1 résultat incertain (observation n° 8.487) et d'une polyarthrite rhumatoïde peu évolutive évoluant depuis 2 à 3 ans (observation n° H 8.500 bon résultat).

Enfin dans un cas (observation THC... N° 1.180) l'Acide Méfénamique a permis d'équilibrer une polyarthrite rhumatoïde ancienne sévère chez qui un ulcus contre-indiquait les corticoïdes par voie générale.

- 2 spondylarthrites ankylosantes ont pû être étudiées.

- Un bon résultat (observation n° H 8.168 KNA...) par traitement d'emblée pour une spondylarthrite peu évolutive jusque là négligée.

- Un résultat nul (observation n° H 7.779 VOI...) chez une spondylarthrite ankylosante ancienne sévère.

Nous avons pû étudier deux cas de coxite.

- Un très bon résultat (observation n° H 7.429 FIN...) a pû être obtenu avec 1 gramme d'Acide Méfénamique par jour, par contre pour l'observation n° 7.715 (DRO...) le résultat a été nul.

Aucun cas de goutte n' pû malheureusement être étudié dans cette série pendant la durée de notre observation.

.../...

II - ARTHROSES

- 4 observations d'arthroses ont été recueillies.

Tableau n° 2

DIAGNOSTICS	NOMBRE DE CAS	RESULTATS			TOLERANCE	
		bon	incertain	nul	bonne	mauvaise
GONARTHROSES	1	1	-	-	1	-
COXARTHROSES	1	-	-	1	1	-
CERVICARTHROSES	1	1	-	-	1	-
CARVICARTHROSES ET LOMBALGIES	1	1	-	-	1	-
	4	(3/4)	-	(1/4)	(4/4)	-

Dans 1 cas (coxarthrose) le résultat a été nul (observation n° H 8.452 TET...) mais il faut noter que dans cette observation l'aspirine avait été sans effet et que la solution etait chirurgicale.

Dans les 3 cas l'Acide Méfénamique a soulagé les malades.

Il n'ya pas eu d'intolérance; à noter que dans l'observation n° C. 7.908, l'Acide Acétylsalycilique avait provoqué des gastralgies non reproduites par l'Acide Méfénamique.

III - RADICULALGIES

12 radiculalgies ont été traitées par l'Acide Méfénamique (tableau n° 3)

- 9 sciatiques
- 3 névralgies cervico-brachiales

Tableau n° 3

DIAGNOSTICS	NOMBRE DE CAS	RESULTATS			TOLERANCE	
		bon	incertain	mul	bonne	nauvaise
SCIATIQUE	9	3	4	2	8	1
N. C. B.	3	-	1	2	2	1
	12	(3	5	4)	(10	2)
			12			12

a)Névralgies cervico-brachiales

Sur 3 cas nous notons 2 échecs sur le plan antalgique chez 2 malades tolérant bien le produit et 1 résultat moyen chez une malade présentant une gastralgie acide banale. A noter que dans cette observation (n° C 8.456 FER...) 0,750 gramme d'Acide Méfénamique ont le même effet que 1 gramme d'Aspirine.

b) Sciatiques

9 observations ont été réunies.

On note 3 bons résultats sur la douleur (observations n° H 8.603 et n° H 8.527 et H 8.479), sur ces trois sciatiques, 2 (observations n°H 8.527 et H 8.479) étaient d'intensité modérée.

L'observation n° H 8.603 MAR... nous a permis d'étudier l'efficacité de l'Acide Méfénamique sur une sciatique douloureuse paralysante.

Le produit a fait rapidement regresser la symptomatologie douloureuse, mais la paralysie n'a cédé qu'aux injections intra-rachidiennes de corticoïdes.

Nous notons 4 résultats médiocres ou incertains (observations n° H 8.425 N° H 8.534 n° H 8.418 et n° H 8.406)

Ces résultats incertains peuvent paraître surprenants mais il faut insister sur la difficulté de juger un antalgique lorsque l'on est obligé de l'associer à d'autres thérapeutiques, depuis le repos strict sur plan dur, jusqu'aux décontracturants.

Enfin 2 échecs totaux sont à noter (observations n° H 8.417 et H 8.699).

o) Radiculalgies

Sur 12 cas de radiculalgies on note donc :

- 4 échecs
- 5 résultats douteux
- 3 bons résultats.

IV PERIARTHRITES SCAPULO-HUMERALES

3 observations ont été recueillies (tableau n° 5)

On note 2 résultats moyens (observation n° H 8.434 et H 8.412), mais par contre un bon résultatpersistant (observation n° C 8.432).

V CEPHALEES

Nous n'avons pû réunir que 4 observations (tableau n° 5) dont 3 céphalées banales mais hyperalgiques, et une céphalée cataméniale.

Il n'y a pas eu d'intolérance et dans les 4 cas la sédation de la douleur s'est effectué en 3/4 d'heure, 1 heure.

VI DIVERS

12 observations se rapportent à des cas qui ne peuvent être groupés du fait de leur variété (tableau n° 4).

Elles vont d'un syndrome douloureux après avulsion de dent de sagesse, jusqu'à un myélome. Il est très difficile de conclure du fait de la grande diversité des observations, mais on remarque :

- que sur deux syndromes douloureux pour ostéoporomalacie il a été noté :
  - 1 résultat nul (observation n° 7.834)
  - 1 résultat incertain (observation 8.571), divers antalgiques employés avaient été sans effet.
- qu'une ostéïte ischio-pubienne après prostatectomie

a été améliorée par l'Acide Méfénamique (observation n° H 8.661)

- que le syndrome douloureux d'une myélomatose décalcifiante multiple (observation n° H 8.564) a été très améliorée par le produit.

Tableau n° 4

DIAGNOSTICS	NOMBRE DE CAS	RESULTATS			TOLERANCE	
		bon	incertain	nul	bonne	mauvaise
OSTEOPOROMALACIE	2	-	1	1	2	-
OSTEITE ISCHIO-PUBIENNE	1	1	-	-	1	-
METASTASES OSSEUSES	1	-	-	1	1	-
MYELOME	1	1	-	-	1	-
ARTERITE TEMPORALE	1	1	-	-	1	-
ARTHRALGIES SIMPLES	1	-	-	1	1	-
ODONTALGIE	1	1	-	-	1	-
ENTORSE DU POUCE	1	1	-	-	1	-
METATARSALGIES	1	-	-	1	1	-
DYSPLASIE DOULOUREUSE HANCHE	1	1	-	-	1	-
DYSMENORHEE	1	-	-	1		1
	12	(6	1	5)	(11	1)
			12			12

Si nous récapitulons, l'ensemble de ces résultats, nous notons (tableau n° 5) que :

sur 50 malades traités il y a :
- 25 bons résultats
- 10 résultats incertains
- 15 échecs

Encore faut-il remarquer que les 10 malades dont les résultats sont incertains ont néanmoins, vraisemblablement, bénéficié du traitement.

Quant à la tolérance, elle a été excellente et on a observé que 4 incidents mineurs dont 1 seul aurait nécessité l'arrêt du traitement.

On remarquera que l'efficacité de l'Acide Méfénamique n'est pas identique selon les maladies envisagées.

Ainsi dans les radiculalgies on ne note que 3 bons résultats sur 12 observations, soit 25 % de succès.

dans les péryarthrites scapulo-humérales 33 % de bons résultats.
dans les arthroses 75 % " " "
dans les arthrites 57 % " " "

avec 60 % de bons résultats dans les polyarthrites rhumatoïdes et plus particulièrement dans les polyarthrites rhumatoïdes débutantes (75 % de bons résultats.

Tableau n° 5

DIAGNOSTICS	NOMBRE DE CAS	RESULTATS			TOLERANCE	
		bon	incertain	nul	bonne	mauvaise
ARTHRITES 15						
P.C.E.	11	6	1	4	10	1
S.P.A.	2	1	1	-	2	-
ARTHRITES INFECTIEUS.	2	1	-	1	2	-
RADICULALGIES 12						
N.C.B.	3	-	1	2	2	1
SCIATIQUES	9	3	4	2	8	1
DIVERS	12	6	1	5	11	1
ARTHROSES	3	-	-	1	4	-
P.S.H.	3	1	2	-	3	-
CEPHALEES	4	4	-	-	4	-
	50	(25	10	15)	(46	4)
			50		50	

Conclusions

L'Acide Méfénamique a été administré per os à 50 malades atteints de syndromes algiques divers.

987 g d'Acide Méfénamique ont été prescrits sur un total de 976 jours.

- Notre attention a d'abord été attirée par la très bonne tolérance du produit. Dans 92 % des cas la tolérance a été excellente malgré l'existence de troubles digestifs divers et d'une intolérance à d'autres antalgiques chez une bonne partie de ces malades.

- Les 4 intolérances observées ne représentent que des incidents mineurs tous d'ordre digestif et une seule méritait l'abandon du traitement.

L'effet antalgique, même si nous éliminons les résultats incertains (20 %), a été bon dans 50 % des cas.

Si l'indication de l'Acide Méfénamique peut paraître discutable lors des radiculalgies, il représente un médicament d'appoint intéressant dans les arthrites et plus particulièrement les polyarthrites rhumatoïdes, ce qui recoupe les constatations du Pr Fl. Delbarre, et dans les douleurs des arthroses.

L'étude de l'effet antalgique de l'Acide Méfénamique n'a porté que sur 4 cas de céphalées mais les résultats très encourageants (4 bons résultats) demanderaient une étude plus complète.

Aisément maniable, bien toléré, sans contre-indication formelle actuelle, l'Acide Méfénamique trouve sa place parmi les antalgiques, tant en médecine générale qu'en rhumatologie où il permet souvent de repousser l'échéance d'un traitement plus agressif, ou de diminuer la dose des anti-inflammatoires majeurs.

BIBLIGRAPHIE

(1) CASS ET FREDERIK - Journal of pharmacology and expérimental thérapeutios (vol 139 n° 2 1.963)

(2) WINDER - WAX - SUTTI-SHEWER - JONES ET SHORT - Journal of pharmacology and expérimental thérapeutics (vol 138 n° 3 1962)

(3) Florian DELBARRE - Expérimentation d'un médicament à base d'Acide Méfénamique.

(4) P. GALMICHE et B. VIRGILI - Etude clinique de l'effet antalgique de l'acide Méfénamique - Gazette Médicale (sous presse)

o o o o o o o o o o o

NOMS	DIAGNOS-TICS	NOMBRE DE JOURS	POSOLOGIE	DOSE TOTALE	TRAITEMENT ASSOCIE	EFFET	TOLERANCE CLINIQUE
KNA. H 8.168	S.A.	56	1 g puis 1,250 g	78,50	Antibio-tiques.	bon	excellente
PAR.. H.8.500	P.C.E.	8	1 g	8	Antibio-tiques	bon	excellente
BRO H 8.390	P.C.E.	70	0,750 g	52,50	infiltrat.	bon	excellente
DUA. H 8.477	P.C.E.	12	0,750 g	9	infiltrat.	nul	excellente
FIW. H 7.429	Coxite	40	1 g	40	-	bon	excellente
TCHI H 1.180	P.C.E.	94	1 g	94	infiltrat.	bon	excellente
FRA C 4.307	P.C.E.	6	o,750 g	4,50	-	nul	gastralgie
BLA H 5.899	P.C.E.	43	1 g	43	Indocid dont il permet de baisser la dose	bon	excellente
INS H 8.567	P.C.E.	27	1,500 g	40,50		bon	excellente
BAR H 8.487	P.C.E.	33	1 g	33	Antibio-tiques infiltrat.	incertain	excellente
DAY H 8.437	P.C.E.	19	0,750 g	14,250	corticoïd.	nul	excellente
DRO H 7.715	Coxite	16	1g	16		nul	excellente
VOI H 7.789	S.P.A. Sévère	21	1 g	20	Tanderil infiltrat.	incertain	excellente
IDJ H 8.406	Sciatique	22	1 g	22	Flexartal repos	incertain	excellente
TAH H 8.479	Sciatique	15	1 g	15	repos	bon	excellente
MIC H 8.669	Sciatal-gies	15	0,750 g	3,75	repos	nul	excellente
DEW H 8.418	Sciatique	6	1 g	6	repos	incertain	excellente
LAL H 8.527	Sciatique nodules de fibro-sité	11	1 g	11	repos in-filtrat. des nodules	bon	excellente
DEL H 8.354	Sciatique	9	0,750 g	6,75	Flexartal trous sac.	incertain	excellente

MOL H 8.417	Sciatique	9	1 g	9		nul	excellente
ROD H 8.425	sciatique hémisacra-lisation	12	1 g	12	Flexartal repos trous sacrés	bon	excellente
	ambulat.	15	1 g	15	-	-	-
MAR H 8.603	sciatique ostéopona-lacie	37	1 g puis 1,50	52,50	repos I R	bon	nausées diarrhée
LAR H 8.412	P.S.H.	8	1 g	8	-	incertain	excellente
BOU H 8.434	P.S.H.	12	1 g	12	-	incertain	excellente
FER C. 8456	Cervicart. névralgies C 6	15	0,75 g	11,25	massages	incertain	gastralg. acides
MAN C. 8457	Rachi-arthrose	15	0,75 g	11,25	-	bon	excellente
DAV C 8.454	P.S.H.	15	1 g	15	infiltrat.	bon	excellente
POC C 8.432	P.S.H.	12	0,75 g	9	massages	bon	excellente
LOZ H 8.308	N.C.B.	11	0,50 g	5,50	Flexartal élongat.	nul	excellente
DEW H 8.328	N.C.B.	17	0,75 g	12,75	infiltrat.	nul	excellente
TET H 8.452	Coxarthrose	14	1 g	14	-	nul	excellente
COW H. 8.661	Ostéïte ischio-pubienne	21	1 g	21	repos	incertain	excellente
TRO H 8.362	Ostéopo-rose	10	0,75 g	7,50	-	incertain	excellente
LAU H 7.834	Ostéopo-rose	15	0,75 g	11,25	Albringht	nul	excellente
CHA H 8.524	Cancer mé-tastasé du sein	15	1 g	15	antalgiques multiples	nul	excellente
CHA H 8.564	Myélome	30	1g	30	repos puis melphélan	bon	excellente
MAN H 8.529	arthral-gies	10	1 g	10	-	nul	excellente
COZ H 8.548	Maladie de Horton	2	1,50 g	3	-	bon	excellente
GAY 001	Céphalées frontales	1	0,50 g	0,50	-	bon	excellente

ANN 002	Céphalées	1	0,50 g	0,50	-	bon	excellente
BVI 003	Céphalées occipit.	1	0,50 g	0,50	-	bon	excellente
JEA 004	Avulsion dentaire	2	1,50 g	3	-	bon	excellente
VIR 005	Entorse du pouce	2	1,50	3	-	bon	excellente
JEA 006	Dysménorrhée	2	1 g	2	-	nul	nausées
BEW 007	migraines cataméniales	2	1 g	2	-	bon	excellente
KER C. 8.509	Dysplasie de la hanche	41	0,75 g	30,75	-	bon	excellente
COR C 8.365	Métatarsalgies	12	0,75 g	9	semelles	nul	excellente
NEY C. 7.908	Cervicarthrose	57	0,75 g	12,75	massages	bon	excellente
THE	P.C.E.	27	1,50 puis 2	48	Cortancyl	bon	excellente
GEI H 4.335	P.C.E.	30	0,75 g	22,50	-	nul	excellente